

Indicações: Indicado como laxante suave, para o tratamento da prisão de ventre ocasional, e como antiácido, para alívio de azia e excesso de acidez do estômago.

Modo de uso: Agite antes de usar. Ingerir o Leite de Magnésia de Phillips®, nas doses recomendadas a seguir:

Uso oral. Uso interno. **Antiácido:** 5 a 15 mL (1 colher de chá a 1 colher de sopa), duas a três vezes ao dia. **Laxante:** 30 a 60 mL (2 a 4 colheres de sopa).

Crianças: de 1/4 a 1/2 da dose para adultos, de acordo com a idade.

Composição: Cada 15 mL contém 1200 mg de hidróxido de magnésio em suspensão, equivalente a 8% p/v (80 mg / mL). Excipientes: sacarina sódica, óleo mineral, aroma natural de menta, hipoclorito de sódio e água purificada. **Contraindicações:** alergia a quaisquer componentes da fórmula. Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30° C). Proteger da luz.

Precauções: não ingerir na gravidez ou se estiver amamentando, sem orientação médica. No caso de superdosagem, procure orientação médica.

Precauções como laxativo: não usar em presença de dor abdominal, náuseas, vômitos, alteração nos hábitos intestinais por mais de 2 semanas, sangramento retal e doença renal.

Precauções como antiácido: pode haver efeito laxativo.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Notificado por: **Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.**, Av. Acesso Rodoviário, M.01, Q.09 - TIMS - Serra - ES - CNPJ: 02.433.631/0001-20. **Indústria Brasileira.** Farm Resp.: Dra. Viviane L. Santiago Ferreira - CRF - ES - 5139.

Fabricado por: Natulab Laboratório SA, Rua H, nº 02, Galpão 03 - Urbis II, Santo Antônio de Jesus - Bahia, CNPJ: 02.456.955/0001-83. Indústria Brasileira.

SAC 0800 026 23 95

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC N° 199 de 2006.

AFE nº 1.03764-8



Indicações: Indicado como laxante suave, para o tratamento da prisão de ventre ocasional, e como antiácido, para alívio de azia e excesso de acidez do estômago.

Modo de uso: Agite antes de usar. Ingerir o Leite de Magnésia de Phillips®, nas doses recomendadas a seguir:

Uso oral. Uso interno. **Antiácido:** 5 a 15 mL (1 colher de chá a 1 colher de sopa), duas a três vezes ao dia. **Laxante:** 30 a 60 mL (2 a 4 colheres de sopa).

Crianças: de 1/4 a 1/2 da dose para adultos, de acordo com a idade.

Composição: Cada 15 mL contém 1200 mg de hidróxido de magnésio em suspensão, equivalente a 8% p/v (80 mg / mL). Excipientes: hipoclorito de sódio e água purificada.

Contraindicações: alergia a quaisquer componentes da fórmula.

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30° C). Proteger da luz.

Precauções: não ingerir na gravidez ou se estiver amamentando, sem orientação médica. No caso de superdosagem, procure orientação médica.

Precauções como laxativo: não usar em presença de dor abdominal, náuseas, vômitos, alteração nos hábitos intestinais por mais de 2 semanas, sangramento retal e doença renal.

Precauções como antiácido: pode haver efeito laxativo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Notificado por: **Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda**, Av. Acesso Rodoviário, M.01, Q.09 - TIMS - Serra - ES - CNPJ: 02.433.631/0001-20, **Indústria Brasileira**,

Farm Resp.: Dra. Viviane L. Santiago Ferreira - CRF - ES - 5139.

Fabricado por: Natulab Laboratório SA, Rua H, nº 02, Galpão 03 - Urbis II.

Santo Antônio de Jesus - Bahia. CNPJ: 02.456.955/0001-83. Indústria Brasileira.

SAC 0800 026 23 95

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199 de 2006.

AFE nº 1.03764-8

2016.84.11.16 - 01

